

带状疱疹ワクチン定期接種開始！



令和 7 年 4 月 1 日から**带状疱疹ワクチンの定期接種**（法律によって実施される予防接種）が開始となりました。带状疱疹は誰にでも起こりうる病気で、日本人成人の**90%以上**が発症する可能性があり、特に**50 歳代**から発症率が高くなります。带状疱疹が治った後も継続する痛み（带状疱疹後神経痛）は、生活の質を著しく低下させる疾患です。近年の研究では、带状疱疹ワクチン接種により、带状疱疹の発症及び带状疱疹後神経痛のリスクが大幅に低減することが示されています。

- **定期接種の対象者：**これまで带状疱疹ワクチンを接種したことがなく、以下の年齢に該当する方
- ◆ 令和 7 年度に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、95 歳、100 歳、101 歳以上になる方
※令和 7 年度から令和 11 年度までは、当該年度に 65 歳、70 歳、75 歳、80 歳、85 歳、90 歳、100 歳になる方を対象者とし、令和 7 年度に限り 101 歳以上になる方も対象者として。
 ※令和 12 年度以降は接種時に 65 歳の方が対象者となる予定です。
 - ◆ 60～64 歳の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有し、その障害が身体障害者手帳 1 級相当である方

➤ **带状疱疹ワクチンの種類**

参考資料：一般社団法人日本ペインクリニック学会「带状疱疹ワクチンの定期接種開始に向けての声明文」、医療法人社団 康裕会 浅草クリニック HP、広島市 HP

	乾燥弱毒生水痘ワクチン 「ビケン」	シングリックス筋注用
		
接種回数	1 回	2 回
接種間隔	-	50 歳以上：通常 2 ヶ月間隔
予防効果（有効性） 数字が大きいほど 効果が高いです	60 歳以上：51% ～年齢層別予防効果～ 50-59 歳：69.8% 60-69 歳：64% 70-79 歳：41% 80 歳以上：18%	50 歳以上：97.2% ～年齢層別予防効果～ 50-59 歳：96.6% 60-69 歳：97.4% 70-79 歳：91.3% 80 歳以上：91.4%
予防効果持続期間	5 年程度	11 年程度
神経痛を軽減する率	66.5%軽減	・50 歳以上：100%軽減 ・70 歳以上：85.5%軽減
※広島市における 定期接種自己負担額	4,900 円/回	18,100 円/回

※自己負担額は自治体によって異なります。
 詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。

広島市の带状疱疹ワクチンサイト →→→



带状疱疹ワクチン接種で公費負担を受けられる機会は生涯に一度だけです。接種機会を逃さないようにしましょう！